Algorithmique sur calculatrices

Langage	TI	Casio
Lecture	Prompt X	? → X
Affichage	Disp X	X◢
Affectation	1→X	1→X
Conditionnelle	If *Condition* Then *Instruction 1* Else *Instruction 2* End	If *Condition* : Then *Instruction 1* : Else *Instruction 2* : IfEnd
Boucle avec compteur	For(X,1,N) *Instruction* End	For 1→X To N *Instruction* Next
Boucle "Tant que"	While *Condition* *Instruction* End	While *Condition* *Instruction* WhileEnd

Mémento Python

Instructions	Python 3
Lecture	X=input()
Affichage	print(X)
Affectation	X=1
Séquence d'instructions	Instruction 1 Instruction 2 etc.
Conditionnelle	`if` *Condition* : *Instruction 1* `else:` *Instruction 2*
Boucle bornée	`for X in range(`*début*,*fin*`):` *Instruction* (la valeur finale est exclue)
Boucle non bornée	`while` *Condition* : *Instruction*
Fonctions	`def` $f(x)$: *Instructions* `return` *valeur*
Appel	`f(3)` (image d'une constante) `f(a)` (image d'une variable) `f()` (fonction sans argument)

Vocabulaire des fonctions

Une fonction f est définie sur l'ensemble $\mathcal{D}$ si chaque élément de $\mathcal{D}$ a une image et une seule.
$\mathcal{D}$: ensemble de définition de f.
$f(x)$: image de x.
x : un antécédent de $f(x)$.



Fonction strictement croissante



Si $u < v$ alors $f(u) < f(v)$.

Fonction strictement décroissante



Si $u < v$ alors $f(u) > f(v)$.

Droites et fonctions dans un repère

Soient a et b deux réels.

- **Fonction linéaire : $f(x) = ax$**

La représentation graphique est une droite passant par l'origine.
a est le *coefficient directeur* de la droite.



- **Fonction affine : $f(x) = ax + b$**

La représentation graphique est une droite.
b est l'*ordonnée à l'origine* de cette droite car $b = f(0)$.



$a < 0$ $\quad a = 0$ $\quad a > 0$

Si $A(x_A ; y_A)$ et $B(x_B ; y_B)$ sont deux points distincts de $\mathcal{D}$, $\boxed{a = \dfrac{y_B - y_A}{x_B - x_A}}$

Deux droites non verticales sont parallèles si et seulement si elles ont le même coefficient directeur.

- **Droites d'équation $x = c$**

C'est une droite parallèle à l'axe des y.
$\mathcal{D}$ ne représente pas une fonction car c a une infinité d'images.



Vecteurs du plan

Coordonnées de $\overrightarrow{AB}$

$$\overrightarrow{AB}(x_B - x_A\,;\, y_B - y_A)$$

Norme $\|\overrightarrow{AB}\|$ ou longueur AB

Dans un repère orthonormé :

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$



Milieu M de [AB]

$$x_M = \frac{x_A + x_B}{2}\ ,\ y_M = \frac{y_A + y_B}{2}$$

Colinéarité et déterminant

Soient k un réel et $\vec{u}$ un vecteur.
$k\vec{u}$ est colinéaire à $\vec{u}$ (même direction).



Pour $\vec{u}\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}c\\d\end{pmatrix}$,
le déterminant de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est :

$$\det(\vec{u}, \vec{v}) = ad - bc$$

$\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires
si et seulement si $\det(\vec{u}, \vec{v}) = 0$.

Si $\vec{u}(a\,;\,b)$ alors $k\vec{u}(ka\,;\,kb)$.

Règle du parallélogramme

$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC} \iff$ ABCD parallélogramme.



Relation de Chasles

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$$



Identités remarquables – Distributivité

Pour tous réels a, b, c, d et k, on a les égalités suivantes :

$$k(a+b) = ka + kb$$
$$(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$$

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$
$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$
$$(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$$

Intervalles

$x \in [a\,;b] : a \leqslant x \leqslant b$	$x \in [a\,;+\infty[: a \leqslant x$
$x \in [a\,;b[: a \leqslant x < b$	$x \in]a\,;+\infty[: a < x$
$x \in]a\,;b] : a < x \leqslant b$	$x \in]-\infty\,;b] : x \leqslant b$
$x \in]a\,;b[: a < x < b$	$x \in]-\infty\,;b[: x < b$



Valeur absolue

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

$|a-b|$: distance entre les nombres a et b.

Intervalles centrés

$|x-a| \leqslant r$ si et seulement si $x \in [a-r\,;\,a+r]$.
$|x-a| < r$ si et seulement si $x \in]a-r\,;\,a+r[$.



Vocabulaire des ensembles

$a \in A$	a est élément de l'ensemble A.
$A \subset B$	A est un sous-ensemble (ou une partie) de l'ensemble B ; tous les éléments de A sont éléments de B.
Réunion $A \cup B$ (A union B)	ensemble des éléments de A ou de B (ou des deux).
Intersection $A \cap B$ (A inter B)	ensemble des éléments communs de A et B.

Sous-ensembles de $\mathbb{R}$

Un nombre réel est l'abscisse d'un point sur une droite.
$\mathbb{R}$: ensemble des nombres réels.

Désignation	Notation	Description	Exemples
Entiers naturels	$\mathbb{N}$	$\{0\,;\,1\,;\,2\,;\,\ldots\}$	$12\,;\,78\,;\,100$
Entiers relatifs	$\mathbb{Z}$	$\{0\,;\,-1\,;\,+1\,;\,-2\,;\,\ldots\}$	$-100\,;\,-45\,;\,89$
Nombres décimaux	$\mathbb{D}$	$\frac{n}{10^p}$ $(n \in \mathbb{Z},\, p \in \mathbb{N})$	$-\frac{3}{10}\,;\,\frac{78}{100}$
Nombres rationnels	$\mathbb{Q}$	$\frac{a}{b}$ $(a \in \mathbb{Z},\, b \in \mathbb{N}^*)$	$-\frac{2}{7}\,;\,\frac{1}{3}\,;\,\frac{100}{11}$

$\mathbb{N}^*$, $\mathbb{R}^*$, etc. : ensemble sans l'élément 0.

$\varnothing$: ensemble vide (sans élément).

$\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$: ensemble des réels sans les rationnels (donc ensemble des irrationnels).

Inclusions : $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.

Probabilités conditionnelles



Probabilité de A sachant que B est réalisé (avec $P(B) \neq 0$) :

$$P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

À chaque nœud, la somme des probabilités est égale à 1 :

$$P(A) + P(\overline{A}) = 1 \qquad ; \qquad P_A(B) + P_A(\overline{B}) = 1.$$

Probabilités

Univers Ω d'une expérience aléatoire

Ensemble des n issues possibles de l'expérience : $\Omega = \{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$.

$$0 \leqslant P(x_i) \leqslant 1 \text{ pour } 1 \leqslant i \leqslant n$$
$$P(x_1) + P(x_2) + \cdots + P(x_n) = 1$$
$$P(\Omega) = 1 \text{ (événement certain)}$$
$$P(\varnothing) = 0 \text{ (événement impossible)}$$

Probabilité d'un événement A

$A = \{x_1, \ldots, x_k\}$ est un sous-ensemble de Ω.

$$P(A) = P(x_1) + \cdots + P(x_k)$$

Si les issues sont équiprobables :

$$P(A) = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}$$

$\overline{A}$: événement contraire de A.

$$P(\overline{A}) = 1 - P(A)$$

Probabilité de la réunion de deux événements A et B

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Échantillon

Suite de n résultats obtenue par répétition indépendante d'une même expérience.

Loi des grands nombres

Si n est grand, la fréquence d'un événement observée sur un échantillon de taille n est, sauf exception, proche de sa probabilité. Par exemple pour un jeu de pile ou face, la proportion de « pile » est proche de 50% lorsqu'on effectue un grand nombre de lancers d'une pièce équilibrée.

Statistiques

Soit une série de p valeurs $x_1, \ldots, x_p$, pondérées respectivement par $n_1, \ldots, n_p$.

Moyenne pondérée

$$\bar{x} = \frac{n_1 x_1 + \cdots + n_p x_p}{n_1 + \cdots + n_p}$$

Linéarité de la moyenne

k et c sont deux nombres réels.

$$\overline{kx} = k\bar{x} \qquad \text{et} \qquad \overline{x + c} = \bar{x} + c$$

Médiane

Nombre m tel qu'au moins la moitié des valeurs sont inférieures ou égales à m et au moins la moitié des valeurs sont supérieures ou égales à m.

Quartiles

q_1 et q_3 sont les plus petites valeurs de la série qui permettent de dire :
« Pour au moins 25% des valeurs x, $x \leqslant q_1$ et pour au moins 75%, $x \geqslant q_3$ ».
Écart interquartile : $q_3 - q_1$.

Écart type

$$\sigma = \sqrt{\frac{n_1(x_1 - \bar{x})^2 + \cdots + n_p(x_p - \bar{x})^2}{n_1 + \cdots + n_p}}$$

Fonction carré, fonction inverse

Fonction carré :
pour tout x réel, $f(x) = x^2$



Parabole

Fonction inverse :
pour tout x réel non nul, $f(x) = \frac{1}{x}$



Hyperbole

Arithmétique

- b est multiple de a (ou a est diviseur de b) s'il existe m entier tel que $b = am$.
- Entier pair : multiple de 2. Il s'écrit sous la forme $2k$, $k \in \mathbb{Z}$.
  Entier impair : il s'écrit sous la forme $2k + 1$, où $k \in \mathbb{Z}$.