

Baccalauréat Série ES

Liban - Mai 2011

Stéphane PASQUET
<http://www.mathweb.fr>
contact@mathweb.fr

7 juin 2011

Exercice 1 (4 points) Commun à tous les candidats

Cet exercice constitue un questionnaire à choix multiples. Pour chaque question, indiquer sur votre copie le numéro de la question et la seule réponse exacte.

Barème : Une réponse correcte rapporte 1 point, une réponse fausse ou l'absence de réponse n'enlève ni ne rapporte aucun point.

1. On considère la fonction f définie par $f(x) = \ln(1 - x^2)$. On note $\mathcal{C}_f$ la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé.

- (a) L'ensemble de définition de la fonction f est :

$]0; +\infty[$ $[-1; 1]$ $] - 1; 1[$ $]1; +\infty[$

- (b) Le point de $\mathcal{C}_f$ d'abscisse $\frac{1}{2}$ a pour ordonnée :

$\ln\left(\frac{1}{2}\right)$ $\ln 1 - \ln\left(\frac{1}{4}\right)$ $\ln 3 - 2 \ln 2$ $-0,2876820725$

2. On considère à présent la fonction g définie sur $]1; +\infty[$ par $g(x) = \ln(\ln x)$.

- (a) Sur $]1; +\infty[$, l'inéquation $g(x) > 0$ admet comme ensemble de solutions :

$]1; e[$ $]1; +\infty[$ $]e; +\infty[$ $[e; +\infty[$

- (b) Sur $]1; +\infty[$, l'expression de la dérivée de la fonction g est égale à :

$\frac{1}{\ln x}$ $\frac{1}{x} \times \frac{1}{x}$ x $\frac{1}{x \ln x}$

Exercice 2 (6 points) Commun à tous les candidats

On rappelle que :

- Le taux d'emploi d'une classe d'individus est calculé en rapportant le nombre d'individus de la classe ayant un emploi au nombre total d'individus dans la classe.
- Un individu âgé de 55 ans à 64 ans est appelé un « sénior ».
- UE désigne l'Union européenne.

Selon un rapport de l'INSEE :

« Le taux d'emploi des personnes âgées de 55 à 64 ans est considéré comme un levier privilégié pour limiter l'exclusion de ces personnes du marché du travail et maîtriser les dépenses de retraites. En 2008, il est de 45,6 % dans l'UE, mais seulement de 38,3 % en France alors que l'objectif de l'UE comme de la France est d'atteindre 50 % en 2010. »

Le but de l'exercice est de vérifier si la France a atteint l'objectif visé par l'UE.

Dans tout l'exercice, le taux d'emploi sera exprimé en pourcentage. Les valeurs approchées seront arrondies au dixième.

PARTIE A : ETUDE STATISTIQUE ET INTERPOLATION DE DONNÉES

Le tableau ci-dessous indique le taux d'emploi des seniors en France entre 1992 et 1998 :

Année	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Rang de l'année x_i	0	1	2	3	4	5	6
Taux d'emploi des seniors en % y_i	29.8	29.7	29.6	29.6	29.4	29	28.3

Source : INSEE, Eurostat

1. Déterminer, en utilisant la calculatrice, l'équation de la droite d'ajustement affine de y en x obtenue par la méthode des moindres carrés.
2. Selon cet ajustement, déterminer le taux d'emploi des seniors en 1999.
3. Selon cet ajustement, déterminer si la France a atteint l'objectif fixé en 2010.

PARTIE B : INTERPOLATION DE DONNÉES À L'AIDE D'UN SECOND MODÈLE

Le taux d'emploi des seniors en France est en réalité de 28,8 % en 1999 et on admet qu'à partir de l'année $2000 + n$, il est donné par l'expression $29,9 \times 1,037^n$ où n désigne un entier naturel. Selon ce modèle, déterminer :

1. Le taux d'emploi des seniors en 2010.
2. A partir de quelle année la France aura atteint son objectif.

PARTIE C : EXTRAPOLATION DE DONNÉES SELON UN TROISIÈME MODÈLE

Le tableau ci-dessous indique le taux d'emploi des seniors en France entre 2001 et 2009 :

Année	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Rang de l'année x_i	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Taux d'emploi des seniors en % y_i	31.9	34.7	37	37.8	38.5	38.1	38.2	38.2	38.9

Source : INSEE, Eurostat

Désormais, à partir de 2001, on choisit un modèle logarithmique et on admettra qu'à partir de 2001, le taux d'emploi des seniors est donné par la fonction f définie sur $[9; +\infty[$ par $f(x) = a \ln(x+1) + b$, où a et b désignent deux nombres réels.

1. En considérant les années 2001 et 2006, écrire le système d'équations que doivent vérifier a et b .
2. En déduire que $a = \frac{6,2}{\ln 1,5}$.

Dans la suite, on admettra que $a = 15,3$ et $b = -3,3$.

3. Selon ce modèle, déterminer à partir de quelle année la France aura atteint son objectif.

Exercice 3 (5 points) *Commun à tous les candidats*

On considère les fonctions f , g et h définies sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = e^{-x}$, $g(x) = -x + 1$ et $h(x) = f(x) - g(x)$.


On note $\mathcal{C}_f$ la courbe représentative de la fonction f et Δ la droite représentant la fonction g dans un repère orthonormé du plan.

PARTIE A : POSITION RELATIVE DE $\mathcal{C}_f$ ET DE L'UNE DE SES TANGENTES

- Vérifier, par le calcul, que la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0 est la droite Δ .
- Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $h'(x) = 1 - e^{-x}$.
 - Etudier le signe de $h'(x)$ suivant les valeurs de x .
 - En déduire le sens de variation de la fonction h sur $\mathbb{R}$.
- En utilisant les questions 1) et 2), étudier la position relative de la courbe $\mathcal{C}_f$ et de sa tangente au point d'abscisse 0.

PARTIE B : CALCUL D'AIRES

- Montrer que $\int_0^1 h(x) dx = \frac{1}{2} - \frac{1}{e}$.
- Dans cette question, toute trace de recherche même non aboutie sera prise en compte dans l'évaluation.
Soit a un nombre réel vérifiant $a > 1$. On appelle D le domaine colorié sur le graphique en **annexe**.
On note $\mathcal{A}$ l'aire, exprimée en unité d'aire, du domaine D .
 - Déterminer en fonction de a la valeur de $\mathcal{A}$.
 - Déterminer la limite de $\mathcal{A}$ lorsque a tend vers $+\infty$.

ANNEXE

Exercice 4 (5 points) *Candidats n'ayant pas suivi l'enseignement de spécialité*

On rappelle que pour tout événement A et B d'un univers :

- l'événement « A et B » est noté $A \cap B$,
- la probabilité de l'événement A est noté $P(A)$,
- si $P(A) \neq 0$, alors la probabilité conditionnelle de B sachant A est notée $P_A(B)$.

Lors de l'année de terminale ES, les trois quarts des élèves travaillent sérieusement tout au long de l'année scolaire.

Un candidat au baccalauréat ES a une probabilité de 0,9 d'obtenir son bac s'il a travaillé sérieusement et une probabilité de 0,2 s'il n'a pas travaillé sérieusement pendant l'année scolaire.

Un candidat est dit surpris s'il est admis alors qu'il n'a pas travaillé sérieusement pendant l'année scolaire ou bien s'il est refusé et qu'il a travaillé sérieusement pendant l'année scolaire. On note :

- T l'événement « le candidat a travaillé sérieusement »
- A l'événement « le candidat est admis au baccalauréat ES »
- S l'événement « le candidat est surpris »

On interroge au hasard un candidat au baccalauréat ES.

Dans tout l'exercice, on donnera des valeurs approchées au millième.

1. Construire un arbre pondéré traduisant les données de l'énoncé.
2. Déterminer la probabilité des événements suivants :
 - (a) $T \cap A$
 - (b) $T \cap \overline{A}$
 - (c) $\overline{T} \cap A$
 - (d) $\overline{T} \cap \overline{A}$
3.
 - (a) Déterminer la probabilité que le candidat interrogé soit admis.
 - (b) Le candidat est admis. Déterminer la probabilité que ce candidat ait travaillé sérieusement pendant l'année scolaire.
4. Démontrer que la probabilité de l'événement S est 0,125.
5. On interroge trois élèves au hasard. Calculer la probabilité qu'au moins un élève soit surpris.

Exercice 4 (5 points) Candidats ayant suivi l'enseignement de spécialité

En 2010, les clients d'une banque nationale se répartissent en deux catégories distinctes :

- Catégorie A, composée des clients d'agence
- Catégorie B, composée des clients internet

En 2010, 92 % des clients sont des clients d'agence et 8 % des clients sont des clients internet.

On admet que chaque année, 5 % des clients d'agence deviennent clients internet et inversement 1 % des clients internet deviennent clients d'agence.

On suppose que le nombre de clients de la banque reste constant au cours du temps et qu'un client ne peut faire partie des deux catégories.

On s'intéresse à l'évolution de la répartition des clients de cette banque dans les années à venir.

On note pour tout entier naturel n :

- a_n la probabilité qu'un client de la banque, pris au hasard, soit un client d'agence à l'année $2010 + n$,
- i_n la probabilité qu'un client de la banque, pris au hasard, soit un client internet à l'année $2010 + n$,
- $P_n = (a_n \ i_n)$ la matrice correspondant à l'état probabiliste pour l'année $2010 + n$.

On note M la matrice de transition, telle que pour tout entier naturel n , $P_{n+1} = P_n \times M$.

PARTIE A : ETAT STABLE D'UN GRAPHE PROBABILISTE

Dans cette partie, on donnera des valeurs approchées arrondies au centième.

1. Déterminer le graphe probabiliste correspondant à cette situation.
2. Donner P_0 la matrice traduisant l'état probabiliste initial.

On admettra que $M = \begin{pmatrix} 0,95 & 0,05 \\ 0,01 & 0,99 \end{pmatrix}$

3. (a) Calculer la matrice P_1 .
(b) Déterminer, à l'aide de la calculatrice, la répartition des clients de la banque en 2015.
4. Déterminer, par le calcul, l'état stable de la répartition des clients.
Interpréter le résultat.

PARTIE B : ETUDE DE LA LIMITE D'UNE SUITE RÉCURRENTE

1. (a) A l'aide de la relation $P_{n+1} = P_n \times M$, exprimer a_{n+1} en fonction de a_n et i_n .
(b) En déduire que pour tout entier naturel n , $a_{n+1} = 0,94a_n + 0,01$.
2. On définit la suite (u_n) par $u_n = a_n - \frac{1}{6}$ pour tout entier naturel n .
(a) Montrer que la suite (u_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme.
(b) En déduire l'expression de u_n en fonction de n .
(c) En déduire que pour tout entier naturel n , $a_n = \frac{113}{150} \times 0,94^n + \frac{1}{6}$.
(d) Déterminer la limite de la suite (a_n) lorsque n tend vers $+\infty$. Interpréter le résultat.

CORRECTION

Exercice 1

1. (a) f est définie si $1 - x^2 > 0$. Les racines de $1 - x^2$ sont 1 et -1 et le polynôme est du signe du coefficient de x^2 à l'extérieur des racines.

Donc le domaine de définition est $] - 1; 1[$.

- (b) L'ordonnée du point de $\mathcal{C}_f$ d'abscisse $\frac{1}{2}$ est $f\left(\frac{1}{2}\right) = \ln\left(1 - \frac{1}{4}\right) = \ln \frac{3}{4} = \ln 3 - \ln 4 = \underline{\ln 3 - 2\ln 2}$.

2. (a) $g(x) > 0 \Leftrightarrow \ln(\ln x) > 0 \Leftrightarrow \ln x > 1 \Leftrightarrow x > e$.

Donc l'ensemble des solutions à cette inéquation est $]e; +\infty[$.

- (b) $g(x) = \ln u$, avec $u(x) = \ln x$, donc $g'(x) = \frac{u'}{u} = \frac{\frac{1}{x}}{\ln x} = \boxed{\frac{1}{x \ln x}}$

Exercice 2

PARTIE A

1. La calculatrice nous donne :

$$\boxed{y = -0.22x + 30}$$

2. Selon cet ajustement, le taux d'emploi des seniors en 1999 est :

$$y = -0,22 \times 7 + 30 = \underline{28,46}$$

3. Selon cet ajustement, le taux d'emploi des seniors en 2010 est :

$$y = -0,22 \times 18 + 30 = \underline{26,04}$$

Manifestement, en 2010, le taux d'emploi n'atteindra pas 50 % ; l'objectif ne sera donc pas atteint.

PARTIE B

1. Selon la formule donnée, en 2010, le taux d'emploi des seniors est :

$$29,9 \times 1,037^0 = \underline{29,9}$$

2. Cherchons n tel que $29,9 \times 1,037^n \geq 50$:

$$\begin{aligned} 29,9 \times 1,037^n &\geq 50 &\Leftrightarrow 1,037^n &\geq \frac{50}{29,9} \\ &&\Leftrightarrow \ln(1,037^n) &\geq \frac{50}{29,9} \\ &&\Leftrightarrow n \ln 1,037 &\geq \frac{50}{29,9} \\ &&\Leftrightarrow n &\geq \frac{\frac{50}{29,9}}{\ln 1,037} \\ &&\Leftrightarrow n &\geq 46,027 \end{aligned}$$

Il faudra donc, selon ce modèle, attendre 2047 pour que la France atteigne son objectif.

PARTIE C

1. On souhaite que $f(2001) = 31,9 = a \ln(9 + 1) + b$ et $f(2006) = 38,1 = a \ln(14 + 1) + b$.
Ainsi, on a le système suivant :

$$\begin{cases} a \ln 10 + b = 31,9 & (1) \\ a \ln 15 + b = 38,1 & (2) \end{cases}$$

2. Du système précédent, on déduit (en faisant (2) - (1)) :

$$a(\ln 15 - \ln 10) = 38,1 - 31,9$$

Soit :

$$a = \frac{6,2}{\ln 15 - \ln 10} \approx 15,3$$

3. On a $f(x) = 15,3 \ln(x + 1) - 3,3$ et on souhaite déterminer x tel que $f(x) \geq 50$ d'où :

$$\begin{aligned} f(x) \geq 50 &\Leftrightarrow 15,3 \ln(x + 1) - 3,3 \geq 50 \\ &\Leftrightarrow 15,3 \ln(x + 1) \geq 53,3 \\ &\Leftrightarrow \ln(x + 1) \geq \frac{53,3}{15,3} \\ &\Leftrightarrow x + 1 \geq e^{\frac{53,3}{15,3}} \\ &\Leftrightarrow x \geq e^{\frac{53,3}{15,3}} - 1 \\ &\Leftrightarrow x \geq 31,58 \end{aligned}$$

Donc, la France atteindra son objectif, selon ce modèle, pour $x = 32$, soit en $1992 + 32$, soit en 2024.

Exercice 3

PARTIE A

1. L'équation de la tangente en $x = 0$ est :

$$y = f'(0)(x - 0) + f(0)$$

$$y = -e^{-0}x + e^{-0}$$

$$\boxed{y = 1 - x}$$

Cette dernière équation est bien celle de la droite Δ .

2. (a) $h'(x) = f'(x) - g'(x) = -e^{-x} - (-1) = 1 - e^{-x}$.
(b) $h'(x) > 0 \Leftrightarrow 1 - e^{-x} > 0 \Leftrightarrow 1 > e^{-x} \Leftrightarrow \ln 1 > -x \Leftrightarrow x > 0$.
Ainsi, $h'(x) > 0$ sur $]0; +\infty[$ et $h'(x) < 0$ sur $] -\infty; 0[$.
(c) On en déduit que h est décroissante sur $] -\infty; 0[$ et croissante sur $]0; +\infty[$.
3. $h(0) = f(0) - g(0) = e^{-0} + 0 - 1 = 1 - 1 = 0$. De la question 2, on peut alors dire que $h(x) \geq 0$ sur $\mathbb{R}$, donc $f(x) \geq g(x)$ sur $\mathbb{R}$, ce qui signifie que $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de Δ sur $\mathbb{R}$.

PARTIE B

1. On a :

$$\int_0^1 h(x) dx = \int_0^1 (f(x) - g(x)) dx = \int_0^1 f(x) dx - \int_0^1 g(x) dx = [-e^{-x}]_0^1 - \left[-\frac{1}{2}x^2 + x \right]_0^1 = -e^{-1} + 1 - \left(-\frac{1}{2} + 1 \right)$$

Ainsi :

$$\boxed{\int_0^1 h(x) dx = \frac{1}{2} - e^{-1} = \frac{1}{2} - \frac{1}{e}}$$

2. (a) L'aire du domaine D est donné par $\int_0^1 h(x)dx + \int_1^a f(x)dx$. Ainsi :

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} - \frac{1}{e} + [-e^{-x}]_1^a$$

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} - \frac{1}{e} - e^{-a} + e^{-1}$$


$$\boxed{\mathcal{A} = \frac{1}{2} - \frac{1}{e^a}}$$

- (b) On sait que $\lim_{a \rightarrow +\infty} e^a = +\infty$ et que $\lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{1}{X} = 0$ donc $\lim_{a \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^a} = 0$.

Par conséquent, $\boxed{\lim_{a \rightarrow +\infty} \mathcal{A} = \frac{1}{2}}$.

Exercice 4 Candidats n'ayant pas suivi l'enseignement de spécialité

1. L'arbre pondéré traduisant les données de l'énoncé est le suivant :



2. (a) $P(T \cap A) = P_T(A) \times P(T) = 0,9 \times 0,75 = \underline{0,675}$.
 (b) $P(T \cap \bar{A}) = 0,75 \times 0,1 = \underline{0,075}$.
 (c) $P(\bar{T} \cap A) = 0,25 \times 0,2 = \underline{0,05}$.
 (d) $P(\bar{T} \cap \bar{A}) = 0,25 \times 0,8 = \underline{0,2}$.
3. (a) La probabilité pour que le candidat soit admis est, d'après la formule des probabilités totales :

$$P(A) = P(A \cap T) + P(A \cap \bar{T}) = 0,675 + 0,05 = \underline{0,68}$$

- (b) On a : $P_A(T) = \frac{P(A \cap T)}{P(A)} = \frac{0,675}{0,68} \approx \underline{0,993}$.

La probabilité pour que le candidat ait travaillé sérieusement pendant l'année sachant qu'il est admis est donc égale à 0,993.

4. $P(S) = P(\bar{T} \cap A) + P(T \cap \bar{A}) = 0,075 + 0,05 = \underline{0,125}$

5. On note X la variable aléatoire désignant le nombre de candidats surpris. Alors, $X = \{0; 1; 2; 3\}$.


X suit la loi binomiale de paramètres $n = 3$ et $p = 0,125$ car chaque épreuve est répétée de façon indépendante et chacune d'elles comporte deux issues seulement (le candidat est surpris ou ne l'est pas).

Ainsi, $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - (1 - 0,125)^3 \approx \underline{0,33}$

Exercice 4 *Candidats ayant suivi l'enseignement de spécialité*

PARTIE A

1. Le graphe probabiliste correspondant à cette situation est le suivant :



2. D'après l'énoncé, $P_0 = (0,92 \quad 0,08)$.

3. (a) $P_1 = P_0 M = (0,92 \quad 0,08) \begin{pmatrix} 0,95 & 0,05 \\ 0,01 & 0,99 \end{pmatrix} = (0,92 \times 0,95 + 0,08 \times 0,01 \quad 0,92 \times 0,05 + 0,08 \times 0,99)$.

Donc $P_1 = (0,8748 \quad 0,1252)$

(b) Calculons $P_5 = P_0 M^5 = (0,72 \quad 0,28)$

4. Désignons par $P_\infty = (x \quad y)$ l'état stable de la répartition des clients.

Alors, par définition, $P_\infty = P_\infty M$, soit $(x \quad y) = (x \quad y) \begin{pmatrix} 0,95 & 0,05 \\ 0,01 & 0,99 \end{pmatrix}$.

on a alors le système suivant :

$$\begin{cases} x = 0,95x + 0,01y \\ y = 0,05x + 0,99y \\ x + y = 1 \end{cases}$$

Soit :

$$\begin{cases} 0,05x = 0,01y \\ x + y = 1 \end{cases}$$

D'où :

$$\begin{cases} y = 5x \\ 6x = 1 \end{cases}$$

Ainsi :

$$\begin{cases} x = \frac{1}{6} \\ y = \frac{5}{6} \end{cases}$$

L'état stable est donc : $P_\infty = (0,17 \quad 0,83)$.

Ainsi, après un grand nombre d'années, 17 % des clients seront des clients d'agence et 83 % seront des clients internet.

PARTIE B

1. (a) La relation $P_{n+1} = P_n \times M$ donne : $(a_{n+1} \quad i_{n+1}) = (a_n \quad i_n) \begin{pmatrix} 0,95 & 0,05 \\ 0,01 & 0,99 \end{pmatrix}$ d'où :

$$\begin{cases} a_{n+1} = 0,95a_n + 0,01i_n \\ i_{n+1} = 0,05a_n + 0,99i_n \end{cases}$$

- (b) On sait que pour tout entier naturel n , $a_n + i_n = 1$, donc $i_n = 1 - a_n$. L'équation précédente donne alors :

$$a_{n+1} = 0,95a_n + 0,01(1 - a_n) = \underline{0,94a_n + 0,01}$$

2. (a) $u_{n+1} = a_{n+1} - \frac{1}{6} = 0,94a_n + 0,01 - \frac{1}{6} = 0,94a_n - \frac{0,94}{6} = 0,94\left(a_n - \frac{1}{6}\right).$

Donc $u_{n+1} = 0,94u_n$. Ainsi, (u_n) est géométrique de raison 0,94 et de premier terme $u_0 = a_0 - \frac{1}{6} = 0,92 - \frac{1}{6} = \frac{4,52}{6} = \frac{452}{600} = \frac{113}{150}$.

(b) On en déduit que $u_n = u_0 \times (0,94)^n = \boxed{\frac{113}{150} \times (0,94)^n}.$

(c) On sait que $u_n = a_n - \frac{1}{6}$ donc $a_n = u_n + \frac{1}{6} = \boxed{\frac{113}{150} \times (0,94)^n + \frac{1}{6}}.$

(d) $\lim_{n \rightarrow +\infty} (0,94)^n = 0$ car $0 < 0,94 < 1$.

Ainsi, $\boxed{\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \frac{1}{6}}$ ce qui signifie que la proportion des clients en agence tendra à être égale à $\frac{1}{6}$ au minimum.