

Probabilités

$\Omega = \{e_1; e_2; \dots; e_n\}$ est l'univers constitué de n éventualités, A et B sont deux événements.

- Probabilité d'un événement
 $p(\Omega) = 1$ $p(\emptyset) = 0$ $p(\bar{A}) = 1 - p(A)$
 $p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$
 $A \cap B = \emptyset \Rightarrow A$ et B incompatibles $\Rightarrow p(A \cup B) = p(A) + p(B)$
- Loi de probabilité
À chaque éventualité e_i , on associe une probabilité p_i .

Éventualités	e_1	e_2	$\dots$	e_n
Probabilités	p_1	p_2	$\dots$	p_n

On doit avoir : $p_1 + p_2 + \dots + p_n = 1$.
S'il y a équiprobabilité : $p_i = \frac{1}{n}$.
- Variable aléatoire
 $X = \{x_1; x_2; \dots; x_n\}$ est une variable aléatoire. On note $p_i = p(X = x_i)$.
Espérance : $E(X) = x_1 p_1 + x_2 p_2 + \dots + x_n p_n$
Variance : $V(X) = (x_1 - E(X))^2 p_1 + (x_2 - E(X))^2 p_2 + \dots + (x_n - E(X))^2 p_n$
 $= E(X^2) - [E(X)]^2$ (formule de König-Huygens)
Écart-type : $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$
Écritures avec le symbole « sigma » :
 $E(X) = \sum_{i=1}^n x_i p_i$; $V(X) = \sum_{i=1}^n (x_i - E(X))^2 p_i = \sum_{i=1}^n x_i^2 p_i - \left(\sum_{i=1}^n x_i p_i\right)^2$
Propriétés : pour $a \in \mathbb{R}$ et $b \in \mathbb{R}$, $E(aX + b) = aE(X) + b$
 $V(aX + b) = a^2 V(X)$
 $\sigma(aX + b) = |a| \sigma(X)$.
Jeu équitable : $E(G) = 0$, où G est la variable aléatoire représentant les gains possibles du jeu.
- Probabilités conditionnelles
Probabilité de B sachant A : $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$
 A et B indépendants $\Leftrightarrow P_A(B) = P(B)$
 $\Leftrightarrow P_B(A) = P(A)$
 $\Leftrightarrow P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
- Formule des probabilités totales

Ω	$\begin{matrix} \nearrow P(A) \\ \searrow P(\bar{A}) \end{matrix}$	$\begin{matrix} A \\ \bar{A} \end{matrix}$	$\begin{matrix} \nearrow P_A(D) \\ \searrow P_A(\bar{D}) \end{matrix}$	$\begin{matrix} D \\ \bar{D} \end{matrix}$	$\begin{matrix} \rightarrow P(D \cap A) = P_A(D) \times P(A) \\ \rightarrow P(D \cap \bar{A}) = P_{\bar{A}}(D) \times P(\bar{A}) \end{matrix}$
----------	--	--	--	--	--

$P(D) = P(D \cap A) + P(D \cap \bar{A})$

INTERROS des LYCÉES

LES VRAIS EXOS donnés dans les lycées

20

INTERROS des LYCÉES

1^{re}

1^{RE}

Reforme du lycée

maths

Nathan

LES VRAIS EXOS DONNÉS DANS LES LYCÉES

- Des centaines d'exercices recueillis dans les lycées de France.
- Des énoncés variés, de difficulté progressive, réellement posés par des professeurs dans les classes.
- Tous les corrigés détaillés.

LYCÉES DE FRANCE

POUR UN ENTRAÎNEMENT EFFICACE EN MATHS

- Des rappels de cours synthétiques.
- Des QCM de vérification des connaissances.
- Un minutage pour chaque exercice.
- Des conseils méthodologiques

DES VIDÉOS ET DES COMPLÉMENTS NUMÉRIQUES

- Dans les vidéos, les auteurs vous expliquent le cours et vous aident à résoudre les exos.
- Des liens vers des sites Internet et ressources numériques très utiles.
- Une utilisation très simple grâce à l'application Nathan Live !

Nathan live!

Toute une gamme Nathan pour réviser utile

MES FICHES POUR LE BAC
Physique-Chimie 1^{re}
► Mes fiches Pour réviser vite et bien

ABC du BAC
Excellence Français 1^{re}
► Excellence La mention en plus

ABC du BAC
Réussite Maths 1^{re}
► Réussite Le bac efficace

ISBN 978-209-157415-8
9 782091 574158
MIXTE
Papier issu de sources responsables
FSC® C022030
Nathan

Exos minutés et QCM

Cours et méthodes

Corrigés détaillés

Vidéos d'exos et de cours en accès direct avec

Mémento sur les rabats

Nathan

Le second degré

$f(x) = ax^2 + bx + c$, avec $a \neq 0$.
Discriminant : $\Delta = b^2 - 4ac$.
Forme canonique : $f(x) = a((x - \alpha)^2 + \beta)$, avec $\alpha = -\frac{b}{2a}$ et $\beta = f(\alpha)$.

- Courbe de f (ici, pour $a > 0$)

$\Delta > 0$	$\Delta = 0$	$\Delta < 0$
--------------	--------------	--------------
- Solutions de l'équation $ax^2 + bx + c = 0$

$\Delta > 0$	$\Delta = 0$	$\Delta < 0$
$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$	$x_0 = -\frac{b}{2a}$	Pas de solution
- Propriétés
 $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$; $x_1 x_2 = \frac{c}{a}$
- Factorisation de $ax^2 + bx + c$

$\Delta > 0$	$\Delta = 0$	$\Delta < 0$
$a(x - x_1)(x - x_2)$	$a(x - x_0)^2$	Ne se factorise pas
- Signe de $f(x)$

$\Delta > 0$	$\Delta = 0$	$\Delta < 0$																			
<table><tr><td>$-\infty$</td><td>x_1</td><td>x_2</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>signe de a</td><td>0</td><td>signe de $(-a)$</td><td>0</td><td>signe de a</td></tr></table>	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$	signe de a	0	signe de $(-a)$	0	signe de a	<table><tr><td>$-\infty$</td><td>x_0</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>signe de a</td><td>0</td><td>signe de a</td></tr></table>	$-\infty$	x_0	$+\infty$	signe de a	0	signe de a	<table><tr><td>$-\infty$</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td colspan="2">signe de a</td></tr></table>	$-\infty$	$+\infty$	signe de a	
$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$																		
signe de a	0	signe de $(-a)$	0	signe de a																	
$-\infty$	x_0	$+\infty$																			
signe de a	0	signe de a																			
$-\infty$	$+\infty$																				
signe de a																					

La fonction valeur absolue

$y = |x|$
 $|x| = x$ si $x > 0$
 $|x| = -x$ si $x < 0$
 $x \mapsto |x|$ n'est pas dérivable en 0.

La fonction exponentielle

$y = \exp(x)$
 $e = 2,718...$
 $x \mapsto e^x$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
 $e^0 = 1$; $e^1 = e$ ($\approx 2,718$); $e^{\frac{1}{2}} = \sqrt{e}$
Pour $x \in \mathbb{R}$, $y \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$:

$e^{x+y} = e^x \times e^y$	$e^{nx} = (e^x)^n$
$e^{x-y} = \frac{e^x}{e^y}$	$e^{-x} = \frac{1}{e^x}$

 $(e^x)' = e^x$; $(e^{kx})' = k e^{kx}$
 $x > y \Leftrightarrow e^x > e^y$; $x = y \Leftrightarrow e^x = e^y$

09157415_000_CV.indd 2-6


10/05/2019 13:04

Dérivation

● **Nombre dérivé**
Soient $a \in \mathbb{R}$ et $h \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.
 f est dérivable en $a \iff \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$ tend vers $\lambda \in \mathbb{R}$ quand h tend vers 0.
 $\lambda = f'(a)$ est le *nombre dérivé* de f en a .

● **Équation de la tangente**
 $f'(a)$ est le *coefficient directeur* de la tangente $\mathcal{T}$ à $\mathcal{C}_f$ au point $M(a; f(a))$.

Équation de $\mathcal{T}$: $y = f'(a)(x - a) + f(a)$



● Dérivées usuelles

$f(x)$	k réel	x	x^2	$x^n, n \in \mathbb{N}^*$	$\frac{1}{x}$	$\sqrt{x}$
$f'(x)$	0	1	$2x$	nx^{n-1}	$-\frac{1}{x^2}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$
Domaine de dérivabilité	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$	$]0; +\infty[$

● Opérations sur les dérivées

Soient u et v deux fonctions dérivables sur un même intervalle, et $k \in \mathbb{R}$.

Fonction	ku	$u + v$	uv	$\frac{1}{u}$	$\frac{u}{v}$
Fonction dérivée	ku'	$u' + v'$	$u'v + uv'$	$-\frac{u'}{u^2}$	$\frac{u'v - uv'}{v^2}$

● Signe de la dérivée et sens de variation

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I .

Pour tout $x \in I$	$f'(x) > 0$	$f'(x) < 0$	$f'(x) = 0$
Sens de variation de f	f est strictement croissante sur I	f est strictement décroissante sur I	f est constante sur I

● Extremum local

Soient $a \in \mathbb{R}$ et $b \in \mathbb{R}$, avec $a < b$, et f une fonction dérivable sur $]a; b[$.

f admet un *extremum local* en $x_0 \in]a; b[\iff \begin{cases} f'(x_0) = 0 \\ f' \text{ change de signe en } x_0 \end{cases}$

Suites

● Définition

Une suite est une fonction dont la variable est entière.
Notations possibles d'une suite : $(u(n))$ ou (u_n) .

● Modes de génération

Mode	Notation	Exemple
Explicite	$u_n = f(n)$	$u_n = n^2$, avec $f(x) = x^2$
Relation de récurrence	$u_{n+1} = f(u_n)$	$u_{n+1} = u_n^2$, avec $f(x) = x^2$

● Sens de variation d'une suite

Si, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n \geq 0$, alors la suite est croissante.

$u_{n+1} - u_n \leq 0$, alors la suite est décroissante.

Si la suite est définie de façon explicite sur $\mathbb{N}$ par $u_n = f(n)$, où f est une fonction monotone sur $[0; +\infty[$, alors la suite (u_n) a le même sens de variation que f .

● Suite arithmétique de raison r et de premier terme u_0

Pour $n \in \mathbb{N}$: $u_{n+1} = u_n + r$

$u_n = u_0 + nr$

$u_n = u_p + (n - p)r, \forall p \in \mathbb{N}$

$r > 0$	$r < 0$	$r = 0$
la suite est croissante	la suite est décroissante	la suite est constante

Somme des n premiers entiers :

$1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$

Somme des $n + 1$ premiers termes :

$u_0 + u_1 + \dots + u_n = (n+1) \frac{u_0 + u_n}{2}.$

● Suite géométrique de raison q et de premier terme u_0

Pour $n \in \mathbb{N}$: $u_{n+1} = qu_n$

$u_n = u_0 \times q^n$

$u_n = u_p \times q^{n-p}, \forall p \in \mathbb{N}$

Sens de variation lorsque $u_0 > 0$:

$q > 1$	$0 < q < 1$	$q = 1$
la suite est croissante	la suite est décroissante	la suite est constante

Somme des puissances positives d'un réel $q \neq 1$:

$1 + q + q^2 + \dots + q^n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$

Somme des $n + 1$ premiers termes ($q \neq 1$) :

$u_0 + u_1 + \dots + u_n = u_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$

● Capital C_n placé à taux fixe t %

(C_n) est une suite géométrique de raison $1 + \frac{t}{100}$ et :

$C_n = C_0 \times \left(1 + \frac{t}{100}\right)^n.$

Trigonométrie

$\mathcal{P}$ est un plan muni du repère orthonormé direct $(O, \vec{OI}, \vec{OJ})$.

● Cosinus et sinus d'un nombre réel

Soit M un point du cercle trigonométrique tel que $(\vec{OI}; \vec{OM}) = x$.


$\cos x$: abscisse de M ;

$\sin x$: ordonnée de M .

$-1 \leq \cos x \leq 1$

$-1 \leq \sin x \leq 1$

$\cos^2 x + \sin^2 x = 1$



1 radian : angle tel que $\widehat{IM} = OI$.

Valeurs remarquables :

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0

Propriétés de symétrie :


α	$-x$	$x + 2\pi$	$x + \pi$	$\pi - x$	$x + \frac{\pi}{2}$	$\frac{\pi}{2} - x$
$\cos \alpha$	$\cos x$	$\cos x$	$-\cos x$	$-\cos x$	$-\sin x$	$\sin x$
$\sin \alpha$	$-\sin x$	$\sin x$	$-\sin x$	$\sin x$	$\cos x$	$\cos x$

● Équations trigonométriques

$\cos x = \cos a \Leftrightarrow \begin{cases} x = a + 2k\pi \\ \text{ou} \\ x = -a + 2k\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$

$\sin x = \sin a \Leftrightarrow \begin{cases} x = a + 2k\pi \\ \text{ou} \\ x = \pi - a + 2k\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$

● Fonctions trigonométriques



Les fonctions $x \mapsto \sin x$ et $x \mapsto \cos x$ sont 2π -périodiques.

La fonction $x \mapsto \sin x$ est impaire donc $\sin(-x) = -\sin(x)$.

La fonction $x \mapsto \cos x$ est paire donc $\cos(-x) = \cos(x)$.

Dérivées : $(\sin x)' = \cos x$

$(\cos x)' = -\sin x.$

Produit scalaire

O, A et B sont trois points distincts du plan muni d'un repère orthonormé.

$\vec{u} = \vec{OA}$, avec $\vec{u}(x; y)$; $\vec{v} = \vec{OB}$, avec $\vec{v}(x'; y')$.

● Différentes expressions du produit scalaire

$\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{OA} \cdot \vec{OB} = \|\vec{OA}\| \times \|\vec{OB}\| \times \cos(\vec{OA}, \vec{OB})$

$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy'$

$\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2}(\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2)$


$\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{4}(\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2)$

$\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{4}(\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2)$

Soit H le projeté orthogonal de B sur (OA).

$\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{OA} \cdot \vec{OB} = \vec{OA} \cdot \vec{OH}$

$\vec{u} \cdot \vec{v} = \begin{cases} OA \times OH & \text{si } \vec{OA} \text{ et } \vec{OH} \text{ ont le même sens} \\ -OA \times OH & \text{si } \vec{OA} \text{ et } \vec{OH} \text{ ont des sens opposés} \end{cases}$



● Propriétés

$\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2 = x^2 + y^2$

$\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$

$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \iff \vec{u} \perp \vec{v}$

Équation du cercle de centre $\Omega(a; b)$ et de rayon R : $(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$

Théorème de la médiane :

$CA^2 + CB^2 = 2CI^2 + \frac{1}{2}AB^2$


Théorème d'Al-Kashi :

$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \times AC \cos \alpha$

Pour tout point M du plan,

$\vec{MA} \cdot \vec{MB} = MI^2 - \frac{1}{4}AB^2$

$MA^2 + MB^2 + MC^2$ minimal pour $M = G$ (centre de gravité de ABC).



Vecteur normal, vecteur directeur

Dans le plan muni d'un repère orthonormé, pour $\vec{u} \neq \vec{0}$ et $\vec{v} \neq \vec{0}$:

$\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \text{ et } \vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} \begin{cases} \text{colinéaires} & \iff xy' - x'y = 0 \\ \text{orthogonaux} & \iff xx' + yy' = 0 \end{cases}$

$\vec{u} \neq \vec{0} \text{ vecteur directeur de (AB)} \iff \vec{u} \text{ colinéaire à } \vec{AB}$

$\vec{u} \neq \vec{0} \text{ vecteur normal à (AB)} \iff \vec{u} \cdot \vec{AB} = 0$

Soient a et b deux nombres réels non simultanément nuls et $\mathcal{D}$ une droite.

$\mathcal{D} \text{ a pour équation } ax + by + c = 0 \iff \begin{cases} \vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix} \text{ est un vecteur directeur de } \mathcal{D} \\ \vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \text{ est un vecteur normal à } \mathcal{D} \end{cases}$